

コンセーブ®錠を処方された飼い主さんへ

犬のてんかん日記

監修：渡辺直之先生（渡辺動物病院 会長）



緊急連絡先

制作 物産アニマルヘルス株式会社

3308AH




毎日の体調と
発作の記録ができる
記入式

年 月から 年 月まで

カルテNo.

飼い主さんのお名前

ペットのお名前



「犬のてんかん日記」について

犬のてんかんを獣医師が正しく診断し、お薬の効果や副作用を確認するには、飼い主さんの日頃からの観察がとても大切です。この日記は、そのために必要な事項が6ヵ月分もれなく記入できるようまとめてあります。

発作が起きた時はもちろん、発作が起きていない時でも、愛犬の体調について毎日記録するよう心がけていただければ幸いです。



「犬のてんかん日記」の使い方

- 発作が起きた時の様子を、5～11ページの「てんかん発作記録」に書いておきましょう。5～9ページは通常の発作が起きた時に、10～11ページはいつもとは違った症状などがみられた場合に記入してください。また、毎日の体調については18ページからの「体調チェック」に記入してください。
- 12～17ページの「診察記録」と「投薬記録」は、獣医師の先生に記入してもらいましょう。

発作が起きた時には！

- 愛犬に発作が起きた時は、あわてて抱き上げるなどはせずに、落ち着いて様子を観察するようにしてください。
- 発作を起こしている間にまわりの物にぶつからないよう、クッションなどを置いて体を保護してあげてください。また、噛まれるおそれがあるので、口の中に手などは入れないでください。
- 発作が止まらない場合は、かかりつけの動物病院に連れて行ってください。
- 診断の参考になるので、可能であれば、携帯電話やスマートフォンなどで発作の様子を動画撮影してください。



飼い主さんへのお願い

- てんかんのお薬は勝手に中断しないようにしてください。
- 発作が起きていなくても毎日投与してください。



通常のでんかん発作記録 (記入例)

※診療の参考になるので、よく見られる通常の前作パターンを記録しておきましょう。
いつもとは異なる発作が起きた場合は、10~11ページに記入しましょう。

- ✓ 発作日 20XX年 1月 X日 4:20 AM (発作の長さ 3分間)
・ほかの日時にも同じような発作が起きた場合は、発生した日時をこのスペースに記入してください。

20XX年2月X日 3:30PM

- ✓ 発作開始前は何をしていましたか? (寝ていた、遊んでいた、など)
部屋の中でおもちゃで遊んでいた。

- ✓ 発作前の様子はどうでしたか?
(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)
そわそわして、よだれを垂らしていた。

- ✓ 発作を起こしている間の様子はどうでしたか?
倒れて足を前後にバタバタ動かしてけいれんしていた。

- ✓ 発作後の様子はどうでしたか?
よだれを垂らしたまましばらく放心状態。

- ✓ そのほかに気づいたことはありますか?

通常のでんかん発作記録

※診療の参考になるので、よく見られる通常の前作パターンを記録しておきましょう。
いつもとは異なる発作が起きた場合は、10~11ページに記入しましょう。

- ✓ 発作日 年 月 日 : AM (発作の長さ)
・ほかの日時にも同じような発作が起きた場合は、発生した日時をこのスペースに記入してください。

- ✓ 発作開始前は何をしていましたか? (寝ていた、遊んでいた、など)

- ✓ 発作前の様子はどうでしたか?
(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

- ✓ 発作を起こしている間の様子はどうでしたか?

- ✓ 発作後の様子はどうでしたか?

- ✓ そのほかに気づいたことはありますか?

通常のでんかん発作記録

※診療の参考になるので、よく見られる通常発作パターンを記録しておきましょう。
いつもとは異なる発作が起きた場合は、10～11ページに記入しましょう。

発作日 年 月 日 : ^{AM}/_{PM} (発作の長さ)
・ほかの日時にも同じような発作が起きた場合は、発生した日時をこのスペースに記入してください。

発作開始前は何をしていましたか？ (寝ていた、遊んでいた、など)

発作前の様子はどうでしたか？
(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

発作を起こしている間の様子はどうでしたか？

発作後の様子はどうでしたか？

そのほかに気づいたことはありますか？

通常のでんかん発作記録

※診療の参考になるので、よく見られる通常発作パターンを記録しておきましょう。
いつもとは異なる発作が起きた場合は、10～11ページに記入しましょう。

発作日 年 月 日 : ^{AM}/_{PM} (発作の長さ)
・ほかの日時にも同じような発作が起きた場合は、発生した日時をこのスペースに記入してください。

発作開始前は何をしていましたか？ (寝ていた、遊んでいた、など)

発作前の様子はどうでしたか？
(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

発作を起こしている間の様子はどうでしたか？

発作後の様子はどうでしたか？

そのほかに気づいたことはありますか？

通常のでんかん発作記録

※診療の参考になるので、よく見られる通常発作パターンを記録しておきましょう。
いつもとは異なる発作が起きた場合は、10～11ページに記入しましょう。

発作日 年 月 日 : AM (発作の長さ) PM
・ほかの日時にも同じような発作が起きた場合は、発生した日時をこのスペースに記入してください。

発作開始前は何をしていましたか？(寝ていた、遊んでいた、など)

発作前の様子はどうでしたか？
(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

発作を起こしている間の様子はどうでしたか？

発作後の様子はどうでしたか？

そのほかに気づいたことはありますか？

通常のでんかん発作記録

※診療の参考になるので、よく見られる通常発作パターンを記録しておきましょう。
いつもとは異なる発作が起きた場合は、10～11ページに記入しましょう。

発作日 年 月 日 : AM (発作の長さ) PM
・ほかの日時にも同じような発作が起きた場合は、発生した日時をこのスペースに記入してください。

発作開始前は何をしていましたか？(寝ていた、遊んでいた、など)

発作前の様子はどうでしたか？
(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

発作を起こしている間の様子はどうでしたか？

発作後の様子はどうでしたか？

そのほかに気づいたことはありますか？

いつもとは異なるてんかん発作記録

※診療の参考になるので、いつもと異なる発作があった時に記録しておきましょう。

発作日 年 月 日 ()

発作開始時刻 :

発作終了時刻 :

発作の長さ

発作開始前は何をしていましたか？(寝ていた、遊んでいた、など)

発作前の様子はどうでしたか？

(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

発作を起こしている間の様子はどうでしたか？

発作後の様子はどうでしたか？

そのほかに気づいたことはありますか？

いつもとは異なるてんかん発作記録

※診療の参考になるので、いつもと異なる発作があった時に記録しておきましょう。

発作日 年 月 日 ()

発作開始時刻 :

発作終了時刻 :

発作の長さ

発作開始前は何をしていましたか？(寝ていた、遊んでいた、など)

発作前の様子はどうでしたか？

(落ち着きがなくなった、よだれを垂らしていた、など)

発作を起こしている間の様子はどうでしたか？

発作後の様子はどうでしたか？

そのほかに気づいたことはありますか？

※獣医師の先生に記入してもらいましょう。

てんかんの診察記録

日付(年・月・日)

診察

. .

てんかんの診察記録

日付(年・月・日)

診察

. .

※獣医師の先生に記入してもらいましょう。



投薬記録

日付	お薬記録	備考(血中濃度など)
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:

日付	お薬記録	備考(血中濃度など)
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:

※獣医師の先生に記入してもらいましょう。



投薬記録

日付	お薬記録	備考(血中濃度など)
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:

日付	お薬記録	備考(血中濃度など)
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:
年 月 日()~ 月 日() (日分)	お薬 : 投薬量: 錠/回を1日 回	測定日: 濃度:

体調チェック

_____年_____月

日	投薬	発作回数	元気	食欲	天気・気温
【例】	✓	0 ①②③ 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
1		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
2		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
3		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
4		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
5		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
6		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
7		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
8		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
9		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
10		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
11		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
12		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
13		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
14		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
15		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
16		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
17		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
18		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
19		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
20		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
21		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
22		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
23		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
24		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
25		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
26		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
27		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
28		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
29		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
30		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
31		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・

愛犬の体調メモ



▼愛犬の様子(体調について良くなったこと、悪くなったこと、いつもと違うこと)や、ほかに気になったことなどがあれば書いておきましょう。

★ごはんの内容を変えるなど、生活習慣上の変化があったら、そのことも記録しておきましょう。

Blank lined area for writing notes.

体調チェック

_____年_____月

日	投薬	発作回数	元気	食欲	天気・気温
【例】	✓	0 ①②③ 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
1		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
2		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
3		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
4		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
5		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
6		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
7		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
8		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
9		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
10		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
11		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
12		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
13		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
14		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
15		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
16		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
17		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
18		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
19		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
20		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
21		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
22		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
23		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
24		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
25		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
26		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
27		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
28		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
29		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
30		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
31		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・

愛犬の体調メモ



▼愛犬の様子(体調について良くなったこと、悪くなったこと、いつもと違うこと)や、ほかに気になったことなどがあれば書いておきましょう。

★ごはんの内容を変えるなど、生活習慣上の変化があったら、そのことも記録しておきましょう。

Blank lined area for notes.

体調チェック

_____年_____月

日	投薬	発作回数	元気	食欲	天気・気温
【例】	✓	0 ①②③ 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
1		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
2		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
3		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
4		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
5		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
6		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
7		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
8		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
9		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
10		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
11		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
12		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
13		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
14		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
15		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
16		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
17		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
18		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
19		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
20		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
21		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
22		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
23		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
24		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
25		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
26		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
27		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
28		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
29		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
30		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
31		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・

愛犬の体調メモ



▼愛犬の様子(体調について良くなったこと、悪くなったこと、いつもと違うこと)や、ほかに気になったことなどがあれば書いておきましょう。

★ごはんの内容を変えるなど、生活習慣上の変化があったら、そのことも記録しておきましょう。

Blank lined area for writing notes.

体調チェック

_____年____月

日	投薬	発作回数	元気	食欲	天気・気温
【例】	✓	0 ①②③ 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
1		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
2		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
3		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
4		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
5		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
6		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
7		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
8		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
9		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
10		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
11		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
12		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
13		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
14		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
15		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
16		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
17		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
18		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
19		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
20		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
21		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
22		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
23		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
24		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
25		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
26		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
27		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
28		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
29		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
30		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・
31		0 1 2 3 4 5	なし 普通 過大	なし 普通 過多	・

愛犬の体調メモ



▼愛犬の様子(体調について良くなったこと、悪くなったこと、いつもと違うこと)や、ほかに気になったことなどがあれば書いておきましょう。

★ごはんの内容を変えるなど、生活習慣上の変化があったら、そのことも記録しておきましょう。

Blank lined area for writing notes.

コンセーブ®錠ご使用の際の注意点

- ほかにてんかんの薬と同様に、コンセーブ®錠に含まれるゾニサミドという成分には、人や動物においてお腹の赤ちゃんに影響を与えてしまう可能性があるという報告があります。お薬の取り扱いには十分に注意し、投薬後には必ず手を洗ってください。特に、妊娠している可能性のある女性や妊婦は、誤って口にしないように気をつけてください。また、お子様が誤って飲み込まないように、お薬はお子様の手の届かないところに保管しましょう。万一、飲み込んでしまった場合には、ただちに医療機関を受診してください。
- コンセーブ®錠を投薬された犬の尿には、ゾニサミドが含まれていますので、尿は適切に処理し、処理後は手を洗ってください。

